



# ای سگریك اور صحت



الیکٹرا نگ سگریٹ ۔ ۔ ۔ یاای سگریٹ ۔ ۔ کو Vapes، E-hookahs، Vape Pens، Tank Systems، Mods) اور Electronic Nicotin Delivery سے (ENDS) بھی کہاجا تا ہے۔ای سگریٹ میں صارفین ای لیکیو ڈکوای سگریٹ ڈیوائس کے ذریعے گرم کر کے سگریٹ کے کش کی طرح اپنے چھیچھڑوں میں سانس کے ذریعے لے جاتے ہیں۔ای سگریٹ کا استعال عام طور پرویینگ کہلاتا ہے۔

> تمبا کوصنعت کے فرنٹ گروپس ای سگریٹ اور نیوناول پروڈ کٹس (<sub>NNPs</sub>) کوفروغ دینے میں تمبا کوانڈسٹری کورد فراہم کررہے ہیں۔ بیان مصنوعات کی ڈیجیٹل ہوشل اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے مارکیٹنگ میں مسلسل

مصروف عمل ہیں۔ وہ دعوی کررہے ہیں کہ بہ مصنوعات محفوظ اورصحت مند ہیں۔ فرنٹ گروپس <sub>NNPs</sub> کو

سگریٹ نوشی کے محفوظ متبادل کے طور پر پیش کررہے ہیں۔

کیاتمہاکوکی صنعت کے فرنٹ گروپس کے دعوے کے مطابق تمہاکوکی نئی مصنوعات صحت کے لیے ہیں؟ تحقیق بہ بات ثابت کرتی ہے ای سگریٹ یا ویپ کے لیکیوڈ میں میں متعدد نقصان دہ مادے ہوتے ہیں اور یبی مادے ویب ایروزول (ویب سے نکلنےوالے بادل، یا بخارات) میں بھی موجود یائے گئے ہیں ان میں سے

چندایک کی تفصیل درج ذیل ہے:

#### نکوٹین

ایک زہریلا مادہ جوتمباکو کا اہم وفعال جزوہے۔اس کی کم ہے کم مقدار بھی ایک محرک کے طور پر کام کرتی ہے اور صارف اس کی لت میں مبتلا ہوجا تا ہے، اس کا مسلسل استعال بیٹوں کو کمز ورکر تاہے۔

#### سیسه /لید

یہ مادہ دل، دماغ، گردوں کو نقصان پہنچانے کی شدید صلاحیت رکھتاہے بیٹون کی کمی اور جسمانی کمزوری کا باعث بنتاہے۔

## آرسینک

پیدادہ بھیای سگریٹ کے فلیورز میں موجودیایا گیاہے، کینسر ہونے میں آرسینک مددگار ہوتا ہے۔

#### بينزين


بینزین بون میرویرنقصان دہانژات کا باعث بنتی ہے خون کے سرخ خلیات میں کمی کاسبب بنتی ہے،جس سے خون کی کمی ہوتی ہے یہ کیمیکل موٹر گاڑیوں کے اخراج میں بھی یا یاجا تاہے۔

فصلوں اور گھاس میں موجود کیڑوں مکوڑوں کو مارنے والى ادويات ميں به يميكل موجود به وتا ہے اور تجيميچيروں کے لئے انتہائی نقصان دہ ہے۔

# ايكرولين

lead

# الثرا فائن ذرات یہ ذرات صحت کے لیے خطرہ ہیں۔



#### فارملدهائيد

پیز ہریلاکیمیکل چیں پھٹروں کی بیاری کا سبب بن سکتا ہےاوردل کی بیاری میں حصد ڈالتا ہے۔

#### ٹایولین

یه کیمیکل آنکھوں اور ناک میں جلن کا موجب ہوتا ہے۔ کمزوری بھکن، الجھن، چکر آنا، سر درد، بے چینی، پھوں کی تھکاوٹ و کمزوری، بےخوابی، بے حسی اور جلد کی سوزش چیسی بیاریوں کامحرک ہے۔



#### ڈائیسیٹیل

سانس کی شدید خرابی اور obliterative bronchiolitis نامی بیاری کاباعث ہے بھیچھڑوں کی بیشکیین بیاری جو نا قابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے یہ ایک مستقل بیاری ہے جس سے متاثر شخص کو ہونے والانقصان عمر بھراس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بیاری کی علامات، خشک کھانسی، تھکاوٹ اور سانس لینے میں دشواری ہیں بی حوالل موت کا سب بھی بن سکتے ہیں۔

#### نيوموكوكي

یہ سی بھی قسم کا افلیش ہے جونون سانس کی نالی وغیرہ کوزیادہ متاثر کرسکتا ہو بینیگ کے باعث افلیشن بڑھنے کے خدشات زیادہ ہیں کیونکہ جدید تجرباتی تحقیق سے پتہ جاتا ہے کہ ویپنگ افلیشن کے لیے ایئر ویز کی حساسیت کو بڑھاتے ہیں۔ جوانسانی صحت کے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔

#### وٹامن ای

یہای سگریٹ اور ویڈپنگ سے اخراج کردہ بخارات کو گاڑھا بنانے کے لئے استعال ہونے والا سیال مادہ ہے، ویڈپنگ سے متاثرہ بیارا فراد کے بھیپھڑوں میں اس سیال کوموجود پایا گیاجو کہ سانس لینے میں دشواری کا سبب ہے۔ عام الفاظ میں کہا جائے تو چھیپھڑوں میں ان کام دھ دھور نجیسی سادی ہے۔



پانی کاموجود ہونے جیسی بیماری ہے۔ پروپیلین گلاکول، ویجیٹیل گلیسرین: ای سگریٹ میں موجود اہم کیمیکلز ہیں جن کوکھانی، بلغی رطوبت، سینے کی حکڑن اور چیسچیٹروں کے کام میں کی سے منسلک کیا گیا ہے، یہ سب دمہ کو برتر بنانے کی بدرجہ اتم صلاحیت رکھتے ہیں۔ ویبنیگ چیسچیٹروں کی ایئرویز میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں چس سے دمہ کے دور سے کاام کان زیادہ ہو

### سیکنڈ ہینڈ ویپ

سینڈ ہینڈ ویپ ایروسول کی زدمیں آنے والے افرادای طرح کوٹین ودگیر کیمیکز جذب کرنے پرمجبور ہیں جیسے سگریٹ نیٹ ویٹ سائٹر ہینڈ ویٹ اس کے بھس تمبا کوانڈسٹری سگریٹ نیٹ والے سگریٹ کے دھوئیں کی زدمیں آکراس سے متاثر ہوتے ہیں۔اس کے بھس تمبا کوانڈسٹری کے فرنٹ گروپس مسلسل اس پروپیگینڈ سے میں مصروف ہیں کہ سینڈ ویپ نان سموکرزیانان ویپرز کے لئے بالکل نقصان دہ نہیں ہے لیکن نوجوانوں پرسینڈ مینڈ ویپ پر ہوئی ایک تحقیق کے مطابق سینڈ ہیڈویپ سائس کی نالی اور بھیچھڑوں کو نقصان پہنچا تا ہے اور بیار ہونے کے خدشات میں اضافہ کرتا ہے۔

#### ویپنگ و مردانه کمزوری

مردانه کمزوری کاسبب بنے والے اجزاء میں ایک نکوٹین بھی ہے، جس کی مخصوص مقدار تم باکومیں موجود ہوتی ہے، جب ای سگریٹ پر تحقیق کی گئی تواس میں بھی نکوٹین کی اچھی خاصی مقدار پائی گئی۔ امریکہ میں ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 20 سے 56 سال کی عمر کے تقریباً 41،000 مردول میں بیربات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ای سگریٹ استعمال کرتے ہیں ان میں تم باکونوش نہ کرنے والوں کے مقابلے میں مردانہ کمزوری کا شکار

ہونے کے ام کانات 4.2 گنازیادہ ہیں۔

## خواتین اور ای سگریٹ

جزل آف دی اینڈوکرائن سوسائی میں شاکع ہونے والی تحقیق کے مطابق، ای سگریٹ کا استعال زرخیزی اور حمل کے نتائج کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہت می نوشی کے محفوظ متبادل نوجوان اور حاملہ خوا تین سگریٹ نوشی کے محفوظ متبادل کروہی ہیں کہ کے ختائج پر منفی انرات مرتب کرتا ہے اور با نجھ پن کی طرف بھی لے جاسکتا ہے لیکن اس بارے میں ابھی شخصی حدود ہے اور بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ کلیدی پیغام: ای سگریٹ اور ویڈیٹ وغیرہ معزصحت



ہیں جبکہ تم باکوانڈسٹری کروڑوں رو پخرج کر کے اپنے فرنٹ گروپس کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پرای سگریٹ اورو بین جنوز کا متبادل پراڈ کٹ بتا کراس کے حق میں روایتی اور سوشل میڈیا پر پوسٹس، بلاگز وغیرہ شئیر کر ہے ہیں تا کہ زیادہ سے زیادہ افراد بشمول خواتین کوان مصنوعات کا عادی بنایا جائے جس کے باعث بیاریاں چھلیں گی عوامی صحت کا توازن بگڑے گا اور صحت کے بجٹ پرغیرضروری بوجھ کا اضافہ ہوگا۔

#### تجاویز و سفارشات

پاکستان میں ای سگریٹ کے حوالے سے ابھی کوئی بھی تک کوئی تفصیلی مطالعہ نہیں اس مطالعہ کویفینی بنایا جائے۔

مختلف بیار یوں پرای سگریٹ کے بخارات کے اثرات کوجانچنے کے لیے ہپتالوں میں خصوصی توجیدی جائے۔

ای سگریٹ اوراس کے لواز مات کی پیداوارودرآمد پر کممل پابندی لگائی جائے۔ چونکہ بخارات بھیں چھٹروں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے بچیں پھٹروں پر اس کے اثرات کو جانچنے کے لیے تحقیق کی جانی چاہیے۔ حکومت تمام ہمپتالوں کو ہدایات جاری کرے کہ اس شمن میں ڈیٹا جمع کرے ۔

حکومت ای سگریٹ کا پیداداری یونٹ لگانے کی اجازت کسی بھی کمپنی کونہ دے۔ سول سوسائٹی تمبا کوصنعت اور اس کے فرنٹ گروپس کو بے نقاب کرے جو اسے محفوظ متبادل کے طور پر فروغ دے رہے ہیں۔

ای سگریٹ کی پرموشن خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو،اس پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے۔